

PROTOCOLE N° 3
Gastro – Entérite

Si un seul enfant présente plus de **trois selles liquides** consécutives, dans la même journée :

- Prendre sa température et si besoin appliquer le **protocole N°1**
- Prévenir les parents pour venir récupérer l'enfant (l'enfant sera repris à la crèche après un traitement de deux jours à la maison).
- proposer à l'enfant du **Soluté de Réhydratation Orale (SRO)** :
1 sachet à diluer dans 200ml d'eau bien fraîche. A conserver au réfrigérateur 24h maximum. A donner à volonté.

En cas de vomissements associés, proposer du SRO très fréquemment par petites quantités (1 à 2 gorgées toutes les 5 à 10 minutes), toujours à volonté.

Si **plusieurs enfants** (supérieur à 3) présentent dans la **même journée une ou plusieurs selles liquides** ou diarrhées consécutives prévenir les parents à leur retour que l'enfant ne sera pas repris à la crèche avant prise d'un traitement durant **48h** à la maison.

Prévenir la personne faisant le ménage de la présence d'enfant atteint de gastroentérite aigue pour adapter le protocole de désinfection. Les jouets doivent être soigneusement nettoyés puis désinfectés.

Lors d'une épidémie de gastro-entérite :

→ bien pratiquer le **lavage de main** entre deux changes et faire laver les mains des enfants après chaque passage aux toilettes et utiliser les **gels hydro-alcooliques (pour le personnel)**.

→ **Faire boire** l'enfant malade régulièrement pour ne pas qu'il se déshydrate (**SRO**).

Date : 26/09/16
Signature et Nom du médecin référent :

 G. H. T. Z.